

CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II

BASEADO NO GUIA PRÁTICO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009. RESPONDA AS QUESTÕES 01 A 31.

01. O uso de drogas ilícitas trazem sensações das mais variadas possíveis. Assinale a droga que traz sensação de redução de sensação de fome, dor e frio e produção de sensações agradáveis:

- a) Crack;
- b) Cola de sapateiro;
- c) Maconha;
- d) Cocaína;

02. O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Controle de Endemias são profissionais com papéis fundamentais, pois são a ligação entre a comunidade e os serviços de saúde. Dentre as ações de vigilância em saúde e controle de vetores, é uma ação específica do Agente de Controle de Endemias:

- a) Identificar sinais e sintomas dos agravos/doenças e orientar os casos suspeitos para procurarem a Unidade Básica de Saúde para diagnóstico e tratamento de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde;
- b) Realizar, quando indicada, a aplicação de larvicidas/moluscocidas químicos e biológicos; a borrifação intradomiciliar de efeito residual; e a aplicação espacial de inseticidas por meio de nebulizações;
- c) Incentivar e mobilizar a comunidade para desenvolver ações simples de manejo ambiental para controle de vetores (insetos, roedores, moscas, entre outros);
- d) Atuar nas residências, informando os seus moradores sobre as doenças – seus sintomas e riscos –, os agentes transmissores e as medidas de prevenção.

03. Uma doença infectocontagiosa que muito preocupa os profissionais de saúde é a Tuberculose. Leia as opções abaixo e marque a opção correta:

I - Atinge os pulmões (forma pulmonar), mas também pode atingir outros órgãos como ossos, rins, meninges, entre outros (forma extrapulmonar);

II - A presença de Cicatriz de Vacina de BCG, quer dizer que a pessoa é vacinada e, portanto, está imune a doença;

III - Nem todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se infectam, assim como nem todas as pessoas infectadas com o bacilo desenvolvem a doença;

IV - Pessoas infectadas com o bacilo podem apresentar sintomas da doença até dois anos após o convívio com o doente;

- a) Se apenas I e II estão corretas.
- b) Se apenas I, II e IV estão corretas.
- c) Se apenas I, III e IV estão corretas.
- d) Se todas estão erradas.

04. Uma das estratégias propostas pelo Ministério da Saúde para identificar a população idosa em risco de doenças/agravos à saúde é:

- a) O correto preenchimento da caderneta de saúde da pessoa idosa e seu acompanhamento pelos profissionais de saúde;
- b) O acompanhamento das famílias e as visitas domiciliares por Agentes Comunitários de Saúde;
- c) As visitas domiciliares realizadas por equipes da Estratégia de Saúde da Família;
- d) A distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão e diabetes;

05. São doenças que não são transmitidas por mosquitos:

- a) Malária e esquistossomose;
- b) Dengue e malária;
- c) Tracoma e esquistossomose;
- d) Tracoma e malária.

CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II

06. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi lançada pelo Ministério da Saúde em:

- a) 2000;
- b) 2008;
- c) 2009;
- d) 2011;

07. Nos últimos anos muito tem se falado sobre a Violência Contra a Mulher. A metade das queixas de violência familiar apresentadas pelas mulheres é:

- a) Violência sexual;
- b) Agressão verbal;
- c) Femicídio;
- d) Agressão física;

08. Dengue é uma das doenças mais frequentes no Brasil, tem como vetor o mosquito *Aedes aegypti*. Sobre o mosquito vetor da Dengue marque V para Verdadeiro e F para Falso:

() No seu ciclo de vida o mosquito apresenta três fases: ovo, larva e pupa;

() A fêmea põe ovos de quatro a seis vezes durante sua vida e em cada vez põe cerca de 1.000 ovos em locais com água parada;

() Um ovo de *Aedes aegypti* pode sobreviver por até 450 dias, mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco;

() Quando não encontra recipientes apropriados (criadouros) a fêmea do *Aedes aegypti*, em casos raros, pode voar a grandes distâncias em busca de outros locais para depositar seus ovos;

A sequência correta é:

- a) F, V, V, V;
- b) F, V, F, V;
- c) F, F, V, V;
- d) V, F, V, F;

09. O planejamento familiar baseia-se no respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Tratando-se de direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais, assinale a afirmativa correta:

- a) A esterilização masculina e feminina não é um método anticoncepcional irreversível que consiste em uma operação que se realiza no homem ou na mulher com o objetivo de se evitar definitivamente a possibilidade de gravidez;
- b) Contraceptivos de emergência pós-coital podem ser utilizados como método de contracepção frequente;
- c) Existe um método ideal para cada tipo de pessoa, por isto, deve-se procurar um profissional de saúde para fazer a indicação do mesmo;
- d) O planejamento familiar pode ser feito pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Adolescentes também têm direito, desde que acompanhado por responsável;

10. As portarias publicadas em 2006 que trazem a população idosa para o centro das prioridades do SUS são:

- a) Portaria 648 e portaria 2.488;
- b) Portaria 648 e lei 8.080;
- c) Portaria 2.488 e portaria 399;
- d) Portaria 2.528 e portaria 399;

11. O consumo de alimentos ricos em ferro previne a anemia e ajuda a levar oxigênio para o bebê, por meio do sangue da mãe. A gestante tem maior aproveitamento do ferro quando come na mesma refeição alimentos ricos em:

- a) Vitamina C e Vitamina A;
- b) Vitamina C e Cálcio;
- c) Vitamina A e Iodo;
- d) Vitamina B e vitamina C;

CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II

12. Desde os primeiros dias de vida, a adoção de cuidados com a saúde bucal deve ser estimulada e motivada pelos profissionais da equipe de saúde. Apresentamos abaixo algumas alterações em saúde bucal mais frequente nas crianças. Marque a alternativa correta:

- a) A Candidíase conhecida como “sapinho”, é uma doença infecciosa causada por bactérias. Apresenta-se como placa esbranquiçada e mole que recobre a língua, bochecha ou palato mole;
- b) A língua geográfica são áreas lisas localizada na língua com margens limitadas e bem definidas que imitam o formato de um mapa, por este motivo que são denominadas língua geográfica. O Agente Comunitário de Saúde deve ficar atento, pois requer tratamento para aliviar a dor e evitar complicações;
- c) A Gengivite de Erupção é uma inflamação localizada na gengiva devido ao surgimento dos dentes de leite. O bebê pode sentir dor, febre e recusa à alimentação. O Agente Comunitário de Saúde pode indicar algumas medidas caseiras, como chá gelado de camomila ou malva e orientar a procurar o dentista da área;
- d) Hematoma de Erupção é uma lesão de coloração azulada na região do dente que está nascendo. Por tratar-se de hematoma deve ser encaminhado o mais rápido possível ao dentista da área;

13. Marque a alternativa que não é uma pandemia:

- a) AIDS;
- b) Tuberculose;
- c) Câncer;
- d) Peste

14. Dentre os muitos tipos de deficiência, temos a Paralisia Cerebral. Marque a alternativa correta quanto a esta deficiência:

- a) Paralisia cerebral não é sinônimo de deficiência intelectual;
- b) Uma pessoa com paralisia cerebral, necessariamente, terá algum tipo de deficiência com o raciocínio e linguagem;
- c) Se a pessoa com paralisia cerebral for acamada, sua posição deve ser modificada no mínimo, a cada 12 horas. Isso é muito importante para evitar deformidades;
- d) Evitar que a pessoa passe por situações estressantes para que não tenha evacuações involuntárias e convulsões;

15. Na temática: Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas há a necessidade de se enfatizar a diferença entre gêneros. Marque V para Verdadeiro e F para Falso no que se refere ao abuso de álcool em mulheres:

() As mulheres em geral, por sua constituição biológica, têm menor sensibilidade ao uso de álcool que os homens;

() As mulheres precisam de menores quantidades de álcool para se alcoolizarem e desenvolverem problemas devido ao uso crônico;

() Mulheres com dependência de álcool costumam sofrer maior estigmatização que os homens e seu uso geralmente se dá fora do ambiente doméstico;

() Não existem quantidades seguras para gestação. O uso de álcool neste período pode acarretar síndrome alcoólico-fetal;

A sequência correta é:

- a) V, V, F, V;
- b) V, F, F, V;
- c) F, V, F, V;
- d) V, F, F, F;

CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II

16. O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Dentre as ações abaixo, assinale a que é a mais eficaz para a redução da morbimortalidade das crianças:

- a) O incentivo ao aleitamento materno;
- b) A busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas;
- c) O incentivo ao cumprimento do calendário vacinal;
- d) A prevenção de acidentes na infância;

17. Durante o primeiro mês de vida e principalmente no primeiro dia, deve-se dar atenção ao funcionamento intestinal do recém-nascido. Assinale a alternativa correta quanto às características das eliminações e cuidados com o recém-nascido:

- a) Nas primeiras 24 horas de vida, os recém-nascidos eliminam o colostro (que é verde bem escuro, quase preto e grudento, parecendo graxa), depois as fezes se tornam esverdeadas e, posteriormente, amareladas e pastosas;
- b) As crianças amamentadas no peito costumam apresentar várias evacuações por dia, mas se as fezes forem líquidas, mesmo que o bebê esteja ganhando peso e mamando bem, trata-se de diarreia e necessita de cuidados;
- c) Se o bebê esta mamando só no peito e fica alguns dias sem evacuar, deve-se orientar chás ou sucos laxantes;
- d) Alguns bebês não evacuam todos os dias e chegam a ficar até uma semana sem evacuar. Se, apesar desse tempo, as fezes estiverem pastosas e a criança estiver mamando bem, isso não é problema;

18. Durante a gestação a mulher precisa ter mais atenção e cuidado na escolha dos alimentos. Com relação à alimentação da gestante é incorreto afirmar:

- a) A gestante deve comer no mínimo seis vezes ao dia, em menores quantidades: café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia;
- b) Não é mito o fato que durante a gestação a mulher precisa comer por dois;
- c) Após as refeições, a gestante deve ingerir meio copo de suco de fruta ou comer uma fruta;
- d) Usar adoçantes somente com recomendação médica;

19. Com relação ao preventivo do câncer do colo uterino marque a alternativa incorreta:

- a) Inicialmente, o exame deve ser feito a cada ano e, caso dois exames seguidos (em um intervalo de 01 ano) apresentarem resultado normal, o exame poderá ser feito a cada 03 anos;
- b) Pode ser usado ducha ou medicamentos vaginais e anticoncepcional local até 24 horas antes do exame;
- c) Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se ao exame preventivo, especialmente se tiver na faixa etária dos 25 aos 59 anos de idade;
- d) Mulheres grávidas podem fazer tranquilamente o preventivo sem prejuízo para si ou para o bebê;

CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II

20. Na assistência à saúde do adulto uma das grandes preocupações são as doenças crônicas, uma destas é a Diabetes Mellitus. Marque a alternativa correta quando o assunto é Diabetes Mellitus:

- a) O Tipo II pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente, em crianças e adolescentes, ou de forma lentamente progressiva em adultos;
- b) O Tipo I normalmente ocorre após os 40 anos e, usualmente, se controla apenas com dieta, atividade física e/ou medicamento oral;
- c) É uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina e tem como fatores de risco a hipertensão arterial, colesterol e triglicérides elevados;
- d) No Tipo II necessita de uso diário de insulina para manter controlado;

21. A triagem neonatal tem como objetivo diagnosticar doenças a tempo de fazer o tratamento precocemente. Dentre estes exames de diagnóstico, um deve ser realizado de preferência ainda na maternidade, mas pode ser feito na UBS pelo médico treinado, nos três primeiros anos de vida. Estamos falando de:

- a) Teste do pezinho;
- b) Teste da orelhinha;
- c) Teste do olhinho;
- d) Todas as alternativas acima estão erradas.

22. Vacina que normalmente é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial é:

- a) Dupla bacteriana;
- b) Febre amarela;
- c) Pneumococo;
- d) Influenza;

23. A adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento físico, moral e psicológico. Dentro desta temática marque V para Verdadeiro e F para Falso.

() A Lei brasileira considera adolescente a faixa etária de 10 a 18 anos;

() Na atenção à saúde, traduz-se no direito de ter privacidade na consulta, atendimento em espaço apropriado e de ter assegurada a garantia de que as questões discutidas durante uma consulta ou uma entrevista não serão informadas aos seus pais ou responsáveis, sem o consentimento dele, o que chamamos de consentimento informado.

() O acesso aos métodos contraceptivos e à orientação sobre o planejamento reprodutivo deve ser facilitado e discutido na perspectiva de seus direitos.

() Todo adolescente com suspeita de DST que apresente os sinais ou queixas, deve ser orientado a procurar a UBS, acompanhado por um responsável, para um exame clínico.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

- a) V, F, V, V;
- b) F, V, V, F;
- c) F, V, V, V;
- d) V, V, F, F;

24. Dentre as alterações em saúde bucal mais frequentes nos idosos, uma é doença sem dor e o único sinal é o sangramento durante a escovação e, se a pessoa deixa de escovar o local, pode piorar ainda mais a situação. Como consequência, o dente fica mole e poderá cair. Estamos falando de:

- a) Candidíase;
- b) Doenças periodontal;
- c) Raízes dentárias expostas;
- d) Feridas de longa duração

CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II

25. Os transtornos alimentares vêm crescendo em incidência nas últimas duas décadas e se manifestando cada vez mais precocemente. Dos transtornos alimentares na adolescência é incorreto afirmar:

- a) Os transtornos estão associados com uma distorção da imagem corporal, na qual a pessoa, apesar de bastante magra, ainda assim continua se achando gorda;
- b) Anorexia Nervosa é caracterizada por uma severa restrição alimentar que é imposta pela própria pessoa. A doença geralmente começa de forma gradual e provoca a princípio, desnutrição e desidratação;
- c) Na Bulimia Nervosa é comum que a pessoa coma uma quantidade exagerada de alimentos e depois utilize métodos compensatórios, tais como a indução de vômitos, o uso de laxantes e diuréticos e a prática de exercício por tempo prolongado e de forma a ficar prostrada, exausta, para evitar o ganho de peso;
- d) Os transtornos alimentares não têm como fator desencadeante eventos como as perdas importantes, separações, mudanças, doenças orgânicas, depressão, ansiedade e distúrbios da imagem corporal;

26. É uma infecção nos olhos causada por uma bactéria. É considerada a principal causa de cegueira evitável no mundo. Alguns sintomas são: lacrimejamento sensação de cisco no olho sensibilidade à luz, coceira, sinais de secreção com pus em pequena quantidade, olho seco e diminuição da visão. Estamos falando de:

- a) Catarata;
- b) Conjuntivite
- c) Tracoma;
- d) Hordéolo (terçol);

27. Se no domicílio tiver uma gestante que ainda não iniciou o pré-natal, o Agente Comunitário de Saúde deverá tomar as seguintes providências, exceto:

- a) Orientá-la a procurar a maternidade de referência para iniciar o pré-natal, pois é considerado pré-natal de alto risco;
- b) Avisar sua equipe sobre a gestante que não realizou consulta;
- c) Orientá-la a buscar a unidade básica de saúde;
- d) Caso ela não compareça para iniciar o pré-natal, deverá ser feita busca ativa;

28. Com relação às características físicas do recém-nascido, marque a alternativa incorreta:

- a) Alguns bebês nascem com cabeça pontuda, o nariz achatado e os olhos “vesgos”. Essas características são anormais e devem ser acompanhadas pelo pediatra;
- b) Algumas marcas podem aparecer na pele resultantes do trabalho de parto, independente da habilidade da pessoa que fez o parto;
- c) Os bebês nascem vermelhinhos, amassados e inchados;
- d) Normalmente os bebês nascem com peso entre 2,5 Kg e 4 Kg e sua altura fica entre 47 e 54 centímetros;

29. Vacina que evita a diarreia por rotavírus é conhecida como:

- a) VOP;
- b) SRC;
- c) DTP+Hib;
- d) VORH;

CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II

30. O puerpério é o período do nascimento do bebê até 45 dias após o parto. Neste período o Agente Comunitário de Saúde deverá dar as seguintes orientações, exceto:

- a) Ela deve retornar ao hospital na ocorrência de sinais de infecção: febre, dor e sangramento;
- b) Deve realizar duas consultas até o 42º dia após o parto;
- c) Ser estimulada para amamentar o bebê, caso não haja contraindicação;
- d) Conferir no cartão da criança se tomou vacina contra Febre Amarela.

31. Dos sintomas de depressão abaixo relacionados 03 são considerados sintomas principais e 01 sintoma acessório. Assinale a alternativa que corresponde ao sintoma acessório:

- a) Fadiga;
- b) Ideias de suicídio;
- c) Humor deprimido;
- d) Perda de interesse pela vida;

BASEADO NO MANUAL: O TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009. RESPONDA AS QUESTÕES 32 A 34.

32. São atividades do Agente Comunitário de saúde, exceto:

- a) Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados;
- b) Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde;
- c) Permanecer na Unidade Básica de Saúde, para facilitar a sua localização por parte da comunidade;
- d) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo;

33. O SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça social, que canalizem maior atenção aos que mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada um. Traduz-se no tratamento desigual aos desiguais, devendo o sistema investir mais onde e para quem as necessidades forem maiores. Estamos falando de:

- a) Participação da comunidade;
- b) Equidade;
- c) Universalidade;
- d) Integralidade;

34. Orienta a descentralização das ações e serviços de saúde, além de favorecer a pactuação entre os gestores considerando suas responsabilidades. Tem como objetivo garantir o direito à saúde da população, reduzindo desigualdades sociais e territoriais. Estamos falando de:

- a) Hierarquia;
- b) Descentralização;
- c) Universalidade;
- d) Regionalização;

BASEADO NAS LEIS, PORTARIAS E NORMAS QUE REGULAMENTAM A ATENÇÃO BÁSICA, RESPONDA AS QUESTÕES 35 A 40.

35. A quantidade de equipes de Saúde da Família na modalidade transitória está condicionada aos seguintes critérios, exceto:

- a) Município com até 20 mil habitantes e com até três equipes poderá ter até duas equipes de Saúde da Família na modalidade transitória;
- b) Município com população entre 20 mil e 50 mil habitantes poderá ter até 50% das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória;
- c) Município com população entre 50 mil e 100 mil habitantes poderá ter até 20% das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória;
- d) Município com população acima de 100 mil habitantes poderá ter até 10% das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória.

CADERNO DE QUESTÕES – MODELO II

36. Dentro da Política Nacional de Atenção Básica, compete as Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal:

- a) Pactuar, com a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica no Estado, de forma complementar às existentes, desde que não haja restrições destas e que sejam respeitados as diretrizes e os princípios gerais regulamentados por portaria;
- b) Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite, por meio do Cosems, estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica no Estado, mantidas as diretrizes e os princípios gerais regulamentados por portaria;
- c) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica;
- d) Definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica;

37. Compete à União prestar assistência financeira complementar para o cumprimento do piso salarial do Agente Comunitário de Saúde. Essa assistência financeira é de:

- a) 95% do Piso Salarial do Agente Comunitário de Saúde.
- b) 85% do Piso Salarial do Agente Comunitário de Saúde.
- c) 75% do Piso Salarial do Agente Comunitário de Saúde.
- d) 50% do Piso Salarial do Agente Comunitário de Saúde.

38. Com relação ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde é incorreto afirmar:

- a) A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei;
- b) Não tem direito a insalubridade;
- c) Tem valor fixado por Lei Federal;
- d) O piso salarial do Agente Comunitário de Saúde é igual ao do Agente de Combate às Endemias;

39. Com relação ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) marque a alternativa correta:

- a) Devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família, das equipes de atenção básica para populações específicas (Consultórios na Rua, equipes Ribeirinhas e Fluviais etc.) e Academia da Saúde;
- b) Fazem parte da atenção básica, e se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo;
- c) Não podem contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica;
- d) Os NASF não devem utilizar as Academias da Saúde;

40. A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua é:

- a) Apenas dos profissionais do Consultório de Rua;
- b) Das secretarias Municipais de Saúde, Secretaria de Ação Social e Ministério Público;
- c) De todo e qualquer profissional do SUS, com destaque especial para a atenção básica;
- d) Apenas da Atenção Básica;